

고추 (친환경 재배) 고품질 재배력

시 기	생육단계	주요농작업	생육단계별 시비목적	제품 및 시비방법			
2월	초	밭아기 육묘기 파종, 이식기, 밑거름		아카디안29 : 7cc/1말 종자침지처리			
	중						
	하						
3월	초				정식	뿌리활착, 초기생육 증진, 정식스트레스해소, 급성잎마름병 예방	펠휴머스 : 100평 1포
	중						
	하						
4월	초	정식기	토양 염류 개선, 양분흡수 촉진	아카디안29 + 스티물란트 : 20cc(1말) 포기관주 3일 후 정식			
	중						
	하						
5월	초	지주설치, 유인, 1차추비	면역력 증가, 상품성 향상 외피가 두꺼워짐, 수확량 증가	아카디안29 : 20cc(1말) 엽면살포 15일 간격으로 처리			
	중						
	하						
6월	초	꽃고추 수확, 2차 추비	화아분화 촉진, 수확량 증가	브레이크아웃 : 20cc(1말) 엽면살포 15일 간격으로 처리			
	중						
	하						
7월	초	비대효과 극대화		불템플러스 : 5cc(1말) 엽면살포			
	중						
	하						
8월	초	붉은고추 수확, 3차 추비	면역력 증가, 상품성 향상 외피가 두꺼워짐, 수확량 증가	아카디안29 : 20cc(1말) 엽면살포 15일 간격으로 처리			
	중						
	하						
9월	초	붉은고추 수확기	착색향상, 후기비대 칼슘결핍증상 개선 및 예방	카멜레온 : 20cc(1말) 엽면살포 휴마칼 / 칼리보어 : 20cc(1말) 엽면살포 15일 간격으로 처리			
	중						
	하						
10월	초		고온/저온/습해 등의 예방으로 장애우려 5일전 살포 건강한 잎과 줄기 확보, 도장억제	스티물란트50 : 20cc(1말) 엽면살포 실라몰 : 2cc(1말) 엽면살포 30일 간격 처리			
	중						
	하						
병해충관리				공통관리			
탄저병, 곰팡이		프리원	30cc (1말) + 해당약제 혼용살포	아카디안29 : 15일 간격으로 처리 프리원 : 탄저병 발생시 처리			
응애류, 해충 발생시		타르수스	20cc(1말) + 해당약제 혼용살포 타 약제와 혼용 살포시 그 효과가 증대 됩니다.				

▶ 지역별로 재배시기가 다를 수 있습니다.